




- Leyenda**
- Mosaico de tomillares, lastonares y aulagares
 - Espinares de Rosa sp., (en algunos sectores con Genista scorpius)
 - Brezales de Calluna vulgaris, Erica vagans o Erica cinerea
 - Pinares de repoblación
 - Carrascales de Quercus ilex subs. ballota
 - Quejigares de Quercus faginea
 - Melojares de Quercus pyrenaica (a: densos; b: abiertos)
 - Melojares de Quercus pyrenaica en fondo de valle
 - Lindes arboladas riparias dominadas por Populus nigra o Salix atrocinerea
 - Mosaico de saucedas, choperas y cultivos de chopos (Populus x canadensis)
 - Plantaciones de Populus xcanadensis con sotos residuales, generalmente saucedas de Salix atrocinerea
 - Saucedas de Salix atrocinerea y choperas de Populus nigra con enclaves de Populus x canadensis (b: sin Populus x canadensis)

- 2. Mosaico de tomillares, lastonares y aulagares
- 3. Espinares de Rosa.sp (en algunos sectores con Genista scorpius)
- 5. Pinares de repoblación
- 6. Carrascales de Quercus ilex subsp. ballota
- 7. Quejigares de Quercus faginea subsp. faginea

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Infraestructuras viarias | Red fluvial |
| Límites provinciales | Curvas de nivel |
| Límites municipales | Embalses |
| | Núcleos de población |

